

PROFI MAIS SET

Herbizid-Pack gegen Ackerfuchsschwanz, Hühnerhirse, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter im Mais.

Zusammensetzung: **SAMSON 4 SC** + **BUCTRIL**
 40 g/l Nicosulfuron 225 g/l Bromoxynil

Wirkstoffgruppe: HRAC: B (Sulfonylharnstoff) HRAC: C3
Formulierung: Dispersion in Öl (OD) Emulgierbares Konzentrat (EC)
Wirkungsweise: Blattwirkung (ALS-Hemmer) Blattwirkung (Photosynthese-Hemmer)
Aufwandmenge: 1,0 l/ha Samson 4 SC + 0,33 l/ha Buctril

Anwendung:

SAMSON 4 SC Einsatz	Auflagen	BUCTRIL Einsatz	Auflagen
in Mais, gg. Ackerfuchsschwanz, Hühnerhirse und Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, im Nachauflauf, in BBCH 14–16, 1,0 l/ha Samson 4 SC + 0,33 l/ha Buctril, max. 1x			
in Mais, gg. Hühnerhirse und Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, im NA, in BBCH 12–18, 1,0 l/ha, max. 1x	NT103, NW605-1, NW606, NW706, WP734, NG200, NG326-1, NG327	in Mais, gg. Einjährige zweikeim-blättrige Unkräuter, im NA, in BBCH 14–16, 1,5 l/ha, max. 1x	NT103, NW605, NW606, NW705
		in Hopfen, gg. Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, im NA, in BBCH 31–71, 1,5 l/ha, max. 1x, als Reihenbehandlung	NT103, NW605, NW606, NW705, W.: [40]
		außerdem auch zugelassen im Gemüsebau in Zwiebelgemüse, Poree, Spargel und Zuckermais	

Abpackung: 3 x 5 ltr. Samson 4 SC + 1 x 5 ltr. Buctril