

## PROFI FLUROXY

**Wirkstoffgehalt:** 200 g/l Fluroxypyr

**Wirkstoffgruppe:** HRAC: 4, synthetische Auxine

**Formulierung:** Emulgierbares Konzentrat (EC)

**Wirkungsweise:** Blattwirkung, übermäßige Zellteilung

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitraum	Aufwandmenge/ Anwendungshäufigkeit	Auflagen
Winterweichweizen, Wintergerste	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Nachauflauf Frühjahr, BBCH 12–39	1,0 l/ha, max. 1x	NT 103, NW 605-1, 606
Sommerweichweizen, Sommergerste	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Nachauflauf Frühjahr, BBCH 12–39	0,75 l/ha, max. 1x	NT 103, NW 605-1, 606, WP 734
Winterhafer, Winterroggen, Wintertriticale	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Nachauflauf Frühjahr, BBCH 12–31	1,0 l/ha, max. 1x	NT 102, NW 605-1, 606
Sommerhafer	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Nachauflauf Frühjahr, BBCH 12–31	0,75 l/ha, max. 1x	NT 102, NW 605-1, 606, WP 734
Mais	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Nachauflauf Frühjahr, BBCH 13–16	1,0 l/ha, max. 1x	NT 103, NW 605-1, 606
Wiesen und Weiden	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Frühjahr oder Herbst, im Ansaatjahr	0,75 l/ha, max. 1x	NT 102, NW 605-1, 606
Wiesen und Weiden	Ampfer-Arten	während der Vegetationsperiode	2,0 l/ha, max. 1x	NT 108, NW 607-1 Wartezeit: 7 Tage
Wiesen und Weiden	Ampfer-Arten	während der Vegetationsperiode	3,0 ml/l, max. 1x (max. Mittelaufwand 2,0 l/ha) Einzelpflanzenbehandlung, (mit Spritzschirm)	NW 642-1, (641) Wartezeit: 7 Tage