

PROFI

PROFI 360 TF

Wirkstoffgehalt: 360 g/l Glyphosat, (tallowamin-frei)

Wirkstoffgruppe: HRAC: G, Glyzine

Formulierung: Wasserlösliches Konzentrat (SL)

Wirkungsweise: Totalherbizid, nicht-selektiv, systemisch

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitraum	Aufwandmenge/ Anwendungshäufigkeit	Auflagen/ Wartezeit in Tagen [d]
Ackerbaukulturen	Einkeimblättrige und zweikeimblättrige Unkräuter	Frühjahr oder Herbst, bis 2 Tage vor der Saat	5,0 l/ha, max. 1x	NG352, NG404, NT103, NW642-1
Getreidestoppel	Ausfallgetreide, Gemeine Quecke	nach der Ernte, Herbst, mind. 10 Tage vor einer Bodenbearbeitung	5,0 l/ha, max. 1x	NG352, NG404, NT103, NW642-1
Rapsstoppel	Einkeimblättrige und zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallraps	nach der Ernte, Herbst, mind. 10 Tage vor einer Bodenbearbeitung	5,0 l/ha, max. 1x	NG352, NG404, NT103, NW642-1
Mais	Einkeimblättrige und zweikeimblättrige Unkräuter	bis 2 Tage vor der Saat	5,0 l/ha, max. 1x	NG352, NG404, NT103, NW642-1
Zuckerrübe	Einkeimblättrige und zweikeimblättrige Unkräuter	bis 2 Tage vor der Saat	5,0 l/ha, max. 1x	NG352, NG404, NT103, NW642-1
Stilllegungsflächen (Rekultivierung)	Einkeimblättrige und zweikeimblättrige Unkräuter	vor der Saat von Folgekulturen, während der Vegetationsperiode, zur Saatbettvorbereitung vor einer Bodenbearbeitung	5,0 l/ha, max. 1x	NG352, NG404, NT103, NW642-1, VV549
Kernobst (ab Pflanzjahr)	Einkeimblättrige und zweikeimblättrige Unkräuter	Während der Vegetationsperiode	5,0 l/ha, max. 1x	NG352, NG404, NT103, NW642-1, W.: 42 [d]
Weinrebe (ab 4. Standjahr), (Nutzung als Tafel- und Keltertraube)	Einkeimblättrige und zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Acker-Winde)	während der Vegetationsperiode	5,0 l/ha, max. 2x, Abstand mind. 3 Monate	NG352, NG404, NT103, NW642-1, W.: 30 [d]

Abpackung: 20 Liter und 1.000 Liter

Vor Applikation ist immer die aktuelle Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung zu lesen (sowie die Auslegungen der einzelnen Bundesländer zu berücksichtigen)!!