

PROFI GOLDBEET 700 SC

Wirkstoffgehalt: 700 g/l Metamitron

Wirkstoffgruppe: HRAC: 5, Triazinone

Formulierung: Suspensionskonzentrat (SC)

Wirkungsweise: Hemmung der Photosynthese im Photosynthesystem II

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitraum	Aufwandmenge/ Anwendungshäufigkeit	Auflagen
Futtermübe/ Zuckerrübe	Einjähriges Rispengras	bis BBCH 18	2 l/ha (VA) 1,5 l/ha (NA) 1,5l/ha(NA) max. 3x	NG 404 NW 642
	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Klettenlabkraut, Knöterich-Arten)			
Futtermübe/ Zuckerrübe	Einjähriges Rispengras einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Klettenlabkraut, Knöterich-Arten)	BBCH 10-18	1 l/ha 2 l/ha 2 l/ha max. 3x	NG 404 NW 642
Futtermübe/ Zuckerrübe	Einjähriges Rispengras	BBCH 10-19	1,5 l/ha 1,5 l/ha 2 l/ha max. 3x	NG 404 NW 642
	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Klettenlabkraut, Knöterich-Arten)			

Weitere Indikationen in:

Beete, Spinat, Erdbeeren, Kümmel, Gewürzfenichel, Oregano, Minze-Arten, Schnittmangold, Schnittlauch, Spitzwegerich, Thymian gegen Einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Klettenlabkraut, Knöterich-Arten)