

PROFI SLIGA

Wirkstoffgehalt: 100 g/l Propaquizafop

Wirkstoffgruppe: HRAC: 1, Aryloxyphenoxypropionat (FOPs)

Formulierung: Emulgierbares Konzentrat (EC)

Wirkungsweise: Blattwirkung, systemisch

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitraum	Aufwandmenge/ Anwendungshäufigkeit	Auflagen
Ackerbohne	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras, Quecke)	Nachauflauf, BBCH 13-29	0,75 l/ha max. 1x	NW 642-1 WP 734
	Quecke	Nachauflauf Frühjahr, BBCH 13-29	1,5 l/ha max. 1x	NW 609-1 WP 734
Futtermübe/ Zuckerrübe	Quecke	Nachauflauf Frühjahr, ab BBCH 10	1,5 l/ha max. 1x	NW 609-1 WP 733
Futtermübe/ Zuckerrübe	Quecke	Nachauflauf Frühjahr, BBCH 13-29	0,75 l/ha max. 2x	NW 609-1 WP 733
Futtermübe/ Zuckerrübe	einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen einjähriges Rispengras, gemeine Quecke)	Nachauflauf, BBCH 12-39	1 l/ha max. 1x	NW 642-1 WP 733
Winterraps	Quecke	Nachauflauf Herbst, ab BBCH 10	1,5 l/ha max. 1x	NW 609-1
Winterraps	Quecke	Nachauflauf Herbst, ab BBCH 10	0,75 l/ha max. 2x	NW 609-1
Winterraps	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: einjähriges Rispengras, Gemeine Quecke)	Nachauflauf Herbst, BBCH 13-29	1 l/ha max. 1x	NW 642-1
Winterraps	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: einjähriges Rispengras, Gemeine Quecke)	Nachauflauf Frühjahr, BBCH 21-39	0,75 l/ha max. 1x	NW 642-1
Kartoffeln	einjährige einkeimblättrige Unkräuter(ausgenommen einjähriges Rispengras, gemeine Quecke)	Nachauflauf BBCH 13-29	1 l/ha max. 1x	NW 642-1 WP 734
Kartoffeln	Gemeine Quecke	Nachauflauf Frühjahr ab BBCH 9	1,5 l/ha max. 1x	NW 609-1 WP 734
Kartoffeln	Gemeine Quecke	Quecke Nachauflauf Frühjahr ab BBCH 9	0,75 l/ha max. 2x	NW 609-1 WP 734

Weitere Indikationen in:

Bete gegen Quecke

Erdbeeren, Erbsen, Möhre, Phacelia, Sonnenblumen, Speisezwiebeln, Wurzelpetersilie, Lein, Kopfkohl, gegen Gemeine Quecke und einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)