

PROFI ACLO 600 SC

Wirkstoffgehalt: 600 g/l Aclonifen

Wirkstoffgruppe: HRAC: 32; Diphenylether

Formulierung: Suspensionskonzentrat (SC)

Wirkungsweise: Hemmung der Pigmentsynthese

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitraum	Aufwandmenge/ Anwendungshäufigkeit	Auflagen
Kartoffel	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Vor dem Auflaufen	4,0 l/ha, max. 1x	NT 108, NW 607-1, 701, 800 WP 712, 734, 740
Sonnenblume	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Vor dem Auflaufen	4,0 l/ha, max. 1x	NT 108, NW 607-1, 701, 800 WP 712, 740
Ackerbohne	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Vor dem Auflaufen	4,0 l/ha, max. 1x	NT 108, NW 607-1, 701, 800 WP 712, 740
Futtererbse	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Vor dem Auflaufen	4,0 l/ha, max. 1x	NT 108, NW 607-1, 701, 800 WP 712, 740

Weitere Indikationen in:

Speisezwiebel gegen Wolfsmilch-Arten, Möhre/ Pastinak/ Sellerie/ Winterheckenzwiebel/ Porree/ Schalotte/ Knoblauch/ Kerbel/ Minze-Arten/ Salbei gegen Acker-Fuchsschwanz/ Einjähriges Rispengras/ Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Dill/ Schnittpetersilie gegen Acker-Fuchsschwanz/ Einjähriges Rispengras/ Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter/ Gemeiner Windhalm/ Gemeines Kreuzkraut/ Wolfsmilch-Arten, Gemeine Ringelblume/ Koriander/ Gewürzfenichel/ Kümmel/ gegen Acker-Fuchsschwanz/ Einjähriges Rispengras/ Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter/ Gemeiner Windhalm, Dicke Bohne/ Erbsen gegen Acker-Fuchsschwanz/ Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Schnittlauch gegen Acker-Fuchsschwanz/ Einjähriges Rispengras/ Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter/ Gemeines Kreuzkraut/ Wolfsmilch-Arten, Bohnenkraut gegen Gemeines Kreuzkraut/ Wolfsmilch-Arten, Tagetes erecta gegen Einjährige einkeimblättrige Unkräuter/ Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter